

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Bollettino di difesa della vite nr. 10 del 27/07/2018

PERONOSPORA

Le ripetute rugiade mattutine dovute alle notevoli escursione termiche registrate tra il giorno e la notte, potrebbero essere causa di infezione, pertanto è consigliabile proseguire con la copertura utilizzando prodotti a base di:

Rame (6 Kg/anno di s.a., anche per le aziende Biologiche)

OIDIO

Data la presenza della malattia in determinate zone è consigliabile aggiungere al trattamento antiperonosporico anche
Zolfo bagnabile (anche per le aziende Biologiche)

E' possibile utilizzare prodotti a più lunga persistenza, dove si presentano i sintomi della malattia, prestando molta attenzione ai tempi di carenza dei prodotti specialmente nelle varietà a maturazione più precoce.

MUFFA GRIGIA

Si ribadisce l'importanza dell'arieggiamento della fascia grappolo in quanto ci sono state segnalazioni di inizio di marciumi.

FLAVESCENZA DORATA

VEDI ALLEGATO

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, maggiormente riguardanti delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 - Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 /835083 - Unione Prov.le Agricoltori :
Tel. 0144 / 322243 **Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri**

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI