

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite
n° 7 del 27/06/2018

FASE FENOLOGICA: grano di pepe (BBCH 75)

PERONOSPORA

In questa fase e' consigliabile mantenere la copertura sulle nuove emissioni vegetative.

Nei vigneti con presenza di macchie sporulate e in concomitanza di rugiade mattutine, si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando un prodotto di copertura a base di :

RAME (MAX 6 KG/HA ANNO DI S.A., ANCHE PER AZIENDE BIOLOGICHE)

OIDIO

Le condizioni sono molto favorevoli allo suo sviluppo, e considerando la fase fenologica, si consiglia di

trattare con **ZOLFO BAGNABILE COLLOIDALE** (ANCHE PER LE AZIENDE

BIO) alle massime dosi consigliate in etichetta. Successivamente al trattamento liquido, intervenire con

uno **ZOLFO IN POLVERE** ponendo l'accortezza di intervenire a vegetazione asciutta al fine di

evitare ustioni al grappolo.

MUFFA GRIGIA/BOTRITIS CINEREA

Vista la fase fenologica e' consigliabile, nelle aree soggette e nei vigneti di varieta' sensibili, un trattamento utilizzando un prodotto specifico antibotritico

FLAVESCENZA DORATA

A seguito delle risultanze dei monitoraggi in loco, si comunica di **NON EFFETTUARE IL TRATTAMENTO** fino all'emissione del bollettino specifico

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

Coltivatori Diretti 0144/322546
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0144/322243