

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

**ZONA OPERATIVA di OVADA.**

**Bollettino di difesa della vite n° 8 del 04/07/2018**

Fase fenologica prevalente: PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

*(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")*

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di **effettuare un trattamento**

**da Lunedì 2 a Sabato 7 Luglio**

**contro il vettore della malattia con: Etofenprox**

**Qualora sia stata accertata la presenza di Tignole e Tignoletta, prima di procedere al trattamento confrontarsi con il proprio servizio tecnico**

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare. I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.

*Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio completo della vegetazione sottostante prima del trattamento, in caso di fioriture spontanee, anche per le aziende che aderiscono al Bando PSR Misura 10.1.1-Impegno aggiuntivo dell'inerbimento controllato, evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).*

### **VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

*DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).*

**Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 - Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 / 835083**

**Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243**

**Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)**